

Ⅱ 殺菌剤

注1) 基準書中の『使用回数』……………一適用病虫害で、農薬の種類、名称、剤型毎の使用できる回数。

注2) 基準書中の『本剤の使用回数』……………適用病虫害に関わらず、農薬の種類、名称、剤型毎で使用できる回数。

注3) 基準書中の『下記成分を含む農薬の総使用回数』……………適用病虫害に関わらず、同一成分を含有する農薬の種類毎に使用できる回数。

分類	種類	名称	剤型 (有効成分含量)	農薬 コード (単位)	農薬の使用 方法			農薬の使用 方法				毒 性		留意事項		
					適用 病害	希 釈 倍 数	10aあたり 使 用 量	使用時期	処理方法	使 用 回 数	本 剤 の 使 用 回 数	下記成分を 含む農薬の 総使用回数	毒 性		魚毒性	
酸 アミド 剤・ ストロビ リン 剤	アゾキシストロピン・ メタラキシルM剤	ユニフォーム	粒 剤 (アゾキシ ストロピン 2% メタラ キシルM 1%)	1315 (kg)	疫 病	—	6	kg	植付前	作楽土壤 混和	1	1	2	普通物	A	・眼、皮膚に対し刺激性があるので注意すること。
							6~9	kg	大土寄期	株元散布			1			

分類	種類	名称	剤型 (有効成分含量)	農薬 コード (単位)	農薬の使用 方法			農薬の使用 方法				毒 性		留意事項		
					適用 病害	希 釈 倍 数	10aあたり 使 用 量	使用時期	処理方法	使 用 回 数	本 剤 の 使 用 回 数	下記成分を 含む農薬の 総使用回数	毒 性		魚毒性	
そ の 他 殺 菌 剤	シモキサニル・ ベンチアバリカルブ イソプロピル剤	バトファイター	顆粒水和剤 (シモキサニル 24% ベンチアバリカル ブイソプロピル 10%)	1052 (g)	疫 病	2,000 ~ 3,000	100 ~ 180	g	収穫10日前まで	茎葉散布	2	2	2	普通物	A	・目に対して強い刺激性、皮膚に対して刺激性があるので 取扱いに注意すること。 ・かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。